

Plattform Naturförderung (www.biodivers.ch): Übersichtstabelle zu Nutzungszeitpunkten in den Lebensraumtypen

Legende:

- Schnitt, jährlich (meist nur 1. SZP angegeben)
- Schnittzeitpunkt nach DZV
- Schnitt, alle 2 oder alle 3 Jahre
- Herbstweide (optional)
- Beweiden anstelle Schnittnutzung
- Beweiden
- Etzen (Frühjahrsvorweide)

Lebensraumtyp	Anzahl Nutzungen	April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November							
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3								
Mitteuropäische Halbtrockenrasen, Mesobrometen	1-2																													
Blaugrashalden (Seslerion)	0.5-1																													
Rostseggenhalde	0.5																													
Borstgrasrasen (Nardion)	0.5																													
Buntschwingelhalden	0.5																													
Fromentalwiesen (Talfettwiesen, Glatthaferwiesen, umfasst v.a. BFF-Typen extensiv und tw. wenig intensiv genutzte Wiesen)	1-2																													
Bergfettwiese (Goldhaferwiese)	1-2																													
Talfettweide (Kammgrasweide, Cynosurion)	2-4																													
Bergfettweide (Milchkrautweide)	1-2																													
Vielschnittwiesen, intensiv genutzte Wiesen = artenarme Wiesen mit mehr als drei Nutzungen	3-6																													
Historische Nutzung "Heuwiese"	1																													
Historische Nutzung "Öhmdwiese"	2																													

Quellen: Schmid et al. 2007, Oppermann & Gujer 2003, DZV-Vorgaben, Dipner & Volkart 2010, Agrofutura 2018, Schiess 2010, Kapfer 2010