

Plateforme promotion de la nature (www.biodivers.ch): Tableau récapitulatif des périodes d'exploitation dans les différents types d'habitat

Légende:

- Coupe, annuelle (la plupart du temps une seule date de
- ★ Date de coupe selon OPD
- Coupe, tous les 2 ou 3 ans
- Pâture d'automne (optionnelle)
- Pâture à la place de la coupe
- Pâture
- Pâture précoce (mise à l'herbe)

Type d'habitat	Nombre d'utilisations	Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Oktober			Novembre			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Pelouses mi-sèches médio-européennes, prairies mésophiles	1-2																									
Pelouses calcaires sèches à séslerie (Seslerion)	0.5-1																									
Pelouse calcaire fraîche	0.5																									
Pâturage maigre acide (Nardion)	0.5																									
Pelouses rocheuses acides	0.5																									
Prairies de fauche de basse altitude (comprend surtout les types de SPB « prairies extensives » et en partie les « prairies peu intensives »)	1-2								★	★																
Praires de fauche de montagne	1-2											★														
Pâturages de basse et moyenne altitude (Cynosurion)	2-4																									
Pâturages gras subalpins et alpins	1-2																									
Prairies à coupes nombreuses, prairies intensives = prairies pauvres en espèces comptant plus de trois utilisations	3-6																									
Usage historique « prairie à foin »	1																									
Usage historique « prairie à regain »	2																									

Sources: Schmid et al. 2007, Oppermann & Gujer 2003, DZV-Vorgaben, Dipner & Volkart 2010, Agrofutura 2018, Schiess 2010, Kapfer 2010